



ಚತು: ಏಜ್.ಜಿ.ಪ್ರಶಾಂತ್

**ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನೆಗಳು 12ರಿಂದ  
15ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ  
ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಯದ ಹೆಣ್ಣಾನೇ  
ಬೆದೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಲಗವನ್ನು  
ಸೇಳಿಯಲು ಫೆರ್ಮೋನ್ ಎಂಬ  
ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಮೂತ್ರದ  
ಮೂಲಕ ವಿಸರ್ಚೆಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ,  
ಆಗಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ  
ಫೀಳಿಡುತ್ತದೆ. ಸಲಗದ  
ಸಾಂಗತ್ಯಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿ  
ಹಂಬಲಿಸುವ ಸಂಕೇತವದು.**

ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುವುದು, ವಂಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಸಂಕುಲದ ವ್ಯೂಹ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಸುಮಾರು 600 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ಯಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ. ಅದೇ ಆ ವಂಶದ 'ಗೃಹ ವಲಯ'.

ಪ್ರತಿದಿನ ಆನೆಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಕೆ.ಜಿ.ಯಷ್ಟು ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಹತ್ತಾರು ಕಿ.ಮೀ.ಯಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ಗುಂಪು ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ. ಮರಿಗಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಗುಂಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ಕವು ಆನೆಯ ಕೆಲಸ ನೀರು—ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಗ್ಗತ್ತದೆ, ಅಪಾಯದ ಸ್ನಾನೆಳಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಾರಿ ತ್ವರಿತಾಗ ತಂಡವನ್ನು ಪುನಃ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೀಗೆ— ತಂಡದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಇಂತಹ ಪಾಠಗಳು ಮಾರಿಯಾಗೇಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಗಂಡಾನೆ ಮರಿಗಳು ಪುಂಡತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಗುಂಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 9ರಿಂದ 14 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ವರ್ಯಾಸ್ಯಾಗುವ ವೆಳಿಗೆ ಅವುಗಳು ಗುಂಟಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು, ಸ್ತುತ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂಟಿಸಲಗಳು 1,400 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಗೃಹ ವಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನೆಗಳು 12ರಿಂದ 15ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಯದ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಬೆದೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫೆರ್ಮೋನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು (ಸ್ಕ್ರೋಂಟಿಯ, ಆದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸೇಳಿಯಲು ಸುವಿಸುವ ದ್ರವ) ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಸರ್ಚೆಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಫೀಳಿಡುತ್ತದೆ. ಸಲಗದ ಸಾಂಗತ್ಯಕಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಣಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತವದು. ಬೆದೆಯ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವರಾಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಗಂಡಾನೆ ಸಹ ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯವೇಸುವ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ