



ಗಭ್ರಿಣಿಯರನ್ನು ಕಾಡುವ ಮೈಕ್ರೋಕಡಿತೆ

ಗಭ್ರಿಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬತ್ತಿರುವ
ಹೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತನಗಳ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಚಮ್ಮೆ ಹಿಗ್ರಿಡಾಗ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಕಡಿತೆ ಸಹಜವಾಗಿ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ
ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಮೈಕ್ರೋಕಡಿತೆ ಬರುಹುದು.
ಸೂಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಒಿಕಿಟ್ಟೆಯಿಂದ
ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.

■ ಡಾ. ವೀಣಾ ಭಟ್ ಭದ್ರಾವತಿ

ಗೆಣ್ಣಿ ವಶ್ತು ಲಾ ಎಂಪು ತಿಂಗಳ ಗಭ್ರಿಣಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರೀಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಆಗ್ರಹಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಾ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದ ಹೆಗೆಯಿ ನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಳು. ಇದೇ ರಿಷಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಗಭ್ರಿಣಿಯರು ಮೈಯಲ್ಲಾ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಚಮ್ಮೆ ರೋಗದವರ ಹಕ್ಕಿರ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಪನಿದು ಗಭ್ರಿಣಿಯರ ಮೈಕ್ರೋಕಡಿತೆ?

ಗಭ್ರಿಧಾರಕೆಯಾದ ಶೇಕಡೆ 20ರಿಂದ 23ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂಚಮದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋಕಡಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವ್ಯ ತರವಾದ ಕಡಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ್ನು ಕೆಡಿ ದಿನಚರಿಯನ್ನೇ ಏರುಪೆರು ಮಾಡಿ ಶಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗಭ್ರಿಣಿ ತಾಯಿಗಳೇ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನಿಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲದೇ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನಿಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿದ್ದು, ವ್ಯೇದ್ಯರೂ ಕಾಡಾ ಕೂಲಂಕುವವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಗಭ್ರಿಧಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬತ್ತಿರುವ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಚಮ್ಮೆ ಹಿಗ್ರಿಡಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಕಡಿತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗಭ್ರಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಪಾದ ಹಸ್ತಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಕಡಿತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಇದು ಈಸ್ಟ್ರೋಇಜನ್ ಹಾಮೇರ್ನೆನಾಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಳಿದಂದಾಗಿ ಆಗುವಂಥಿತ್ವ. ಇದು ಹೆಗೆಯಿ ನಂತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಭ್ರಿಧಾರಕೆಗಿತ ವೋದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇತ್ತುದಿಗಳು ಗಭ್ರಿಣಿಯರಲ್ಲಿ (ಕೆಲವರಲ್ಲಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯೂ ಆಗಬಹುದು.

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಗಭ್ರಿಧಾರಕೆಗೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋಕಡಿತವನ್ನಿಂಟು ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿವೆ.

ಗಭ್ರಿಧಾರಣೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರಮಿಗೋ

ಈ ಸ್ತ್ರೀಯು ಗಭ್ರಿಧಾರಕೆಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ 7-8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅಟೋಟಿಕ್ ಗಭ್ರಿಧಾರಕೆಯ ಗುಣ್ಣಿಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.) ಶೇ. 8.0 ರಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಭ್ರಿಣಿ ಧರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅದೂ ಹೆಚ್ಚಿಪ್ರಾಯದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಶೇ. 2.0 ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅಟೋಟಿಕ್ ಇದ್ದು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸ್ವಾಂ ಉಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಕಡಿತದ ಹಾಗೆ ಕಾಣೆಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಗಾಂಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಾಗ ಗಭ್ರಿಯಾಗಿ ನಂತರ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಮಾಗಲ್ಲಾ ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾಗಿ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮಲಾಮು ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಲಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನುಗಳು ಹೊಡಬೋಗಾಗಬಹುದು.

ಬಹುರೂಪಿ ಗುಣ್ಣಿಗಳು

ಗಭ್ರಿಣಿಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. 160ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ (ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ) ಈ ತೊಂದರೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೊನೆಯ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾತೆಯಿಂದಿರಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿಶ್ವ ಮೂಡಿಸಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ?

ಇದು ಅವಳಿ-ತ್ವಿವಿ ಮತ್ತೊಳಿರುವ ಗಭ್ರಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಂಡು ಬಂದು (ಶೇ. 11.7 ರಷ್ಟು) ಗಭ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ತೊಕ ಗಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ, ಗಂಡು ಮಗುವಿದ್ದಾಗ, ಬಿಳಿ ಬಳಿದ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಗಭ್ರಿಣಿ ಶಿಶುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಿರಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶದ ಬಿರಿತ ಉಂಟಾಗಿ, ಅಲಜ್‌ಕಾರಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆಗ