

ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಯಿಸ್ಟೆ ಜನ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಉಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಇದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎದೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವನಿದು ಗಭರ್ಕಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್?

ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಗಭರ್ಕೋರಣಿಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಾನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಿಧ್ಯಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏರಂದನೇ ಹಂತ ತಲುಪಿದರೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕ್ಕೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗಿನ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾದಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ತಲುಪಿದರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸುಲಭದ ಮಾತ್ರಲ್ಲ.

‘ಗಭರ್ಕೋರಣಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗಭರ್ಕಂತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸೂವವಾಗುವುದು, ಗಭರ್ಕಾಶಯದ ಹೆಲಳನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೋವು, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರಕ್ತಸೂವವಾಗುವುದು, ಬಿಳಿಮುಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾವ, (ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಜ್ರ್), ಟೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕೆ ರಕ್ತಸೂವ ಆಗುವುದು, ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು, ವಿವರಿತ ಬಳಲಿಕೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೋರ್ಮೆಸ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡ್ಡಾಗಿರುವ ಡಾ. ವಿವೇಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾವ ಆಗಿದೆ.

‘ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಭಿನ್ನವಾಗಬಹುದು’ ಎನ್ನುವ ಈ ವೈದ್ಯರು, ‘ಮತ್ತುಕ್ಕೆದ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸೂವ, ದುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯೋನಿ ಸ್ಥಾವ, ಬೆಂಕು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟಿನೋವು ಕೂಡ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗೆ ಹದಿಹರೆಯರಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿಯಿರು ಎಂಬೇಷಿಟಿ ಲಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಕ್ಷೇಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಿ



ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದ ಕೂಡಲೀ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಹಿಳೆಯಿರು ಗಭರ್ಕಂತ ಸೂಕ್ತ ಸ್ವೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

-ಡಾ. ವಿವೇಕ್ ಬೇರೆತ್ತಾರು,
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡ್ಡಾರು

ಲಸಿಕೆ ಇದೆ!

ಗಭರ್ಕಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡ್ಡಾರೆ ಇಡೀಗ ಉತ್ತಮ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 11 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಕೂಟ್ ಹಾಗೂ 25 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 11 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾತ್ರಕ್ಕಿಗೆ 2 ದೊನ್ಯಾ ಹಾಗೂ 15ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದವರಿಗೆ 3 ದೊನ್ಯಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 30 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಕೂಟ್ವರಿಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗೆ ಮುಂತಪ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟದ ಮಹಿಳೆಯಿರು ಆಗಾಗ ಗಭರ್ಕಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರಿಕ್ಷೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ. ಈ ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಎಚ್‌ಪಿಎ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ತದ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಲಸಿಕೆಗಳು ಎಚ್‌ಪಿಎ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗೊಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಇರುವ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಪ್ ಸ್ಯಿಯರ್ ಪರಿಕ್ಷೇಯನ್ನು 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಕೂಟ್ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.



ತಪ್ಪಿಸಲು ಇರುವ ಸುಲಭದ ದಾರಿ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?

ಗಭರ್ಕೋರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಪರಿಕ್ಷೇಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 21 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಕೂಟ್ ಹಾಗೂ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯಿರು ಎಚ್‌ಪಿಎ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಗಭರ್ಕಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಕಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಪರಿಕ್ಷೇಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಧಿವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎಂಬೂ ಅಧಿವಾ ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಾನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಪ್ ಸ್ಯಿಯರ್ ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್‌ಪಿಎಯನ್ನು ಪರಿಕ್ಷೇಗಳಿಗೂ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು?

‘ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಗಭರ್ಕಂತ ತೆಗೆಯುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರನೇ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಲುಪಿದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ರೇಡಿಯೋಫ್ನೋ, ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಕಾಂಬಿನೇಫನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಮುಖವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಳೇ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಭರ್ಕಂತದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಅಂಗಾಗಳಿಗೂ ಪಸರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ವಿಟ್ಸ್ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಷ್ಟೆ ಹೀಗಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೀ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯಿರು ಗಭರ್ಕಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಯಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ವಿವೇಕ್ ಬೇರೆತ್ತಾರು.

‘ಪ್ರಿಮ್ಯನ್ ಡಿಫೆಸ್ ಬೆಟ್ಟರ್ ದೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ರ್’ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲಿ, ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗೆ ಬರಲಿ, ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ಸೆಚ್‌ರಿಕೆ ವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಡಿಗೆ, ಹೋರ್ಕಾಂಟಿಯಿಕ್ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ದಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಉತ್ತಮ ಹವಾಸ ಬೆಂಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಾನ ಅಪಾಯದ ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: feedback@sudha.co.in