

ರಭ್ರದ ಕೊಲತೆ ನಿವಾರಣೆ

ಬಗೆಬಗೆಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು (HYSTERECTOMY)



ರಭ್ರದ ಕೊಲತೆ
ಸಂತಾನೋಷಣೆಯ
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಜು
ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ಖರುತ್ವಾವಾಗಲು ಈ
ರಭ್ರದ ಕೊಲತೆಯೇ ಸರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಥ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಸರವಾಗುವ ಗಭ್ರಕೊಲತೆ
ಒಮ್ಮೆಯ್ಯಾ ಯಾವ ಯಾವುದೂ
ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗ
ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸ—
ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು

ಅಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದೇ ದಾರಿ. ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯ ನೋವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುಸಿ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆಗ ಜೀವಿತವಧಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕೆಲವರು ಗಭ್ರಕೊಲತೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡರೆ ನನಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ನೆನು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು?

1. ಗಭ್ರಕೊಲತೆ ತೆಗೆಯಿಸಿದರೆ ಶಕ್ತಿ ಮೊರಟು ಮೋಗುತ್ತದೆ, ಜೀವನವಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

☒ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಹಿಳೆಯಿರುವ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಬಹುದೆ. ಆಗ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಈಸ್ಟೋಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಹ್ರೋಫೇಸ್ ನಾ ಹಾಮೋರ್ನಾನ್‌ನಾಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 35-40 ಅಸುಪಾಸಿನ ಮುಹಿಳೆಯಿರುವ ಗಭ್ರಕೊಲತೆ ತೆಗೆಯಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಜಂತೆ ಅಂಡಕೊಲತವನ್ನು ತೆಗೆಯಿಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಹಾಮೋರ್ನಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಾಚು ತಪಡೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ, ಜೀವನೋತ್ತಾಹ ಕುಗ್ಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕೀ ಉದ್ದಾಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ಶ್ರೀಯಾಶೀಲತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

2. ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೋನಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

☒ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಾಮೋರ್ನಾನ್‌ನಾಗಳು 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ತನಕವೂ ಮುಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯಾಶೀಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಗಭ್ರಕೊಲತೆ ನಿವಾರಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಡಾಶಯವನ್ನು ತೆಗೆಯುವೇ ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ತಿಸಲಿದ್ದವುದರಿಂದ ಅವರ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉದ್ದಾಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

3. ಲ್ಯಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿತ್ವದೆ.

☒ ಗಭ್ರಕೊಲತವನ್ನಷ್ಟೆ ತೆಗೆಸಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಲ್ಯಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಭ್ರಕೊಲತದ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವೆಜ್ಯೋನಾರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟೋಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಹ್ರೋಫೇಸ್ ನಾ ಹಾಮೋರ್ನಾನ್ ವೊದಲಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದೇ ಸ್ನಿಗ್ತತೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಂಗಿಕ ಜಟಿಲವಟಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

4. ತೊಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

☒ ಗಭ್ರಕೊಲತ ನಿವಾರಕೆಗೂ ದೇಹ ದಪ್ಪಗಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. 40-45ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇಹ ದಪ್ಪಗಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅದರ ಗಭ್ರಕೊಲತ ನಿವಾರಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೇಹತೊಕ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪಿ ಕಲ್ಪನೆ. ಶ್ರೀಯಾಶೀಲ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸೂಕೆ ಆಹಾರ, ದ್ಯಂಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಡಿಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ದೇಹತೊಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

5. ಗಭ್ರಕೊಲತ ತೆಗೆದು ಹಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಶ್ವಾಸಿತಿಯ ಅಂಗಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹಾಗೂ ಬಹುಜೀಗ ಗಾಯ ಗುಣವಾಗುವುದರಿಂದ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ದ್ಯಂಂದಿನ ಜಟಿಲವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದೋಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ತಪ್ಪಿ ನೌಕರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೇ ರಚಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪು.

6. 2-3 ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಬಳಿಕ ಲ್ಯಾಪೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

☒ ಆದರೆ, ಸುರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಜರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಮೂಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಹೌದು.

ಗಮನಿಸಿ:

- ಗಭ್ರಕೊಲತ ನಿವಾರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಲ್ಯಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಡಾರದು.
- ಗಭ್ರಕೊಲತ ನಿವಾರಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗಭ್ರಕೊಲತವನ್ನಷ್ಟೇ ತೆಗೆಯಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಡಕೊಲತವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಮೋರ್ನಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.



Dr. B. Ramesh

Medical Director, Gynaecology
& Laparoscopic Surgery

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ALTIUS HOSPITAL Pvt.Ltd.

ಹೈಟೆಕ್ ಲ್ಯಾಪೊಸ್ಕೋಪಿ & ಗ್ರೆನ್‌ಮೊಕಾಲಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್
altiushospital@yahoo.com

No 511, Outer Ring Road, 4th Block, HBR Layout, Bangalore - 560043, Ph : 8882799799
www.altiushospital.com