

* ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಲೀಯಾ ಪೂರ್ವವಾಗದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋವನ್ನು ತೇಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಿರಬಹುದು.

* ರಕ್ತದೊತ್ತುದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತಲೆಸುತ್ತು, ವಾಕರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಿಪ್ರೋ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.


* ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಸಂವೇದನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ತುವಿಸಜನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಅನ್ನಿಲೀಯಾದಿಂದಾಗಿ ಹೆಗೆಗೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂಡದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ನಿಜವಾಗಿ ಅಗುವುದೇನು?

ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗಭಿಣೆ ಓಡಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಮಲಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ್ ಹಾಕಿ NST ಮೇಂಫ್ಸ್ ಗೆ ನೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂಡಬಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಮೂಲೆ ಅರಿವಳಿಕೆಯ ವೈದ್ಯರು ಕೆನ್ಪು ಅರ್ಥ ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಗಭಿಣೆಯ ಹಕ್ಕಿರ ಪುಳಿತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವ ವೈದ್ಯರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಬಡಿತ 110 ರಿಂದ 160 ಇರಬೇಕು). ಬಹಳಮ್ಮ ವೇಳೆ ಅದು ಸಹಜ ಹೀತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏರುಪೇರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕೂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೆರಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ವೈದ್ಯರೂ ಗಭಿಣೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗಭಿಣೆಯ ಗಭಾರ್ಶಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಕೋಜನಗಳ ನೋವು ತಿಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಳಿತಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನೋವು ಗಾಗಿ ನಿಂತು ಆಗಿದೆ.



ಮಲಗುತ್ತಾಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ನ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಸಾತ್ತಾ ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಗಭಾರ್ಶಯ ಪ್ರೂರ್ಿತ ತೆರೆದೆಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ (ಇದು ಹೆರಿಗೆಯ ಮೆದಲನೆಯ ಹಂತ), ಈಗ ಹೆರಿಗೆಯ ಎರಡನೆ ಹಂತ ಆರಂಭವಾದಂತೆ. ಆಗ ಗಭಿಣೆ, ಸಂಪುಟನವಾದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಮುಕ್ಕಬೇಕು. ಗಭಾರ್ಶಯದಿಂದ ಯೋನಿಯ ತನಕ ಮಗು ಬರುವುದು ಎರಡನೆಯ ಹಂತ. ಹೆರಿಗೆಗೆ ಗಭಾರ್ಶಯದ ಸಂಕುಚನ ಶೇಕಡಾ 50 ಹಾಗೂ ಗಭಿಣೆಯ ಮುಕ್ಕುವಿಕೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಭಿಣೆಗೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸಂವೇದನೆ (sensation) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕೆರಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೂಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ನಿಲೀಯಾ ದ ಪ್ರಭಾವ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಮುಗಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಒಳಗಿರುವ ಕಂಡುಬುನ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಲೀಯಾ ದ ಪ್ರಭಾವಂತೂ ವಿಂಡಿತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳಮ್ಮ ವೇಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಡಿಪ್ರೋ ಹಾಕಿ NICU ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಭಿಣೆಯಿರಿಗೆ ಅನ್ನಿಲೀಯಾ ದ ಅಡವರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜ್ಞರ ಬರುವುದುಂಟು. ಹಾಗಾದಾಗ ಜ್ಞರಿಂದ ಬಳಿಲಿದ ಗಭಿಣೆ ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವನ್ ಸಹಿಸದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನಿಲೀಯಾ ಬಯಸುತ್ತಾಳಿ. ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಅನ್ನಿಲೀಯಾ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕೆರಿಯನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಅನ್ನಿಲೀಯಾ ಕೊಟ್ಟರೂ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಎನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಹೆರಿಗೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚುಮುಕ್ಕಳ ಬಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಜನ್ಸ್ ವಿದ್ದು ತೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಎಂಬ ಹಂತವನ್ನು ಯುಶ್ಸಿಯಾಗಿ ರಾಟಲು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಗಭಿಣೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಎಂದರೆನು, ಆ ಸನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚನ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗಭಿಣೆಗೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರೆ ಆಕೆ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಧ್ವನಿಸಬಹುದು. ಆಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಅವಳಿಗೆ, ಹೆರಿಗೆ ಅಪ್ಪೊಂದು ತ್ರಾಸದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಹೆರುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಯಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟೇಲೂ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಅಧ್ಯಾಪಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದೀರು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವಯಂ ಯ್ಯಾ ತುಂಬಬೇಕು.

