

ಯಾವುದೇ ಕಾರಿಗಳೇ  
ಬಂದರೂ ಅದು ಇಂಥಿಗೇ  
ಎಂದು ನಿರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು  
ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು  
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು  
ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ  
ಮುನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ  
ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ  
ಅವಲೋಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

### ■ ಡಾ. ವಿನಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಇದು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕನಷ್ಟ್ ಹಕ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಉಂಟವಾದ ಒಳಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹವನ್ನು ಕುಡಿರಬಾರದು. ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ತೀರ ತಡವೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಶಿರತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಬಹುದು.

ಉಪಾಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಒಳಕ್ಕದ ರಕ್ತದ ಸಕ್ತರೆ ಅಂತ (ಸಿಪಿಎಸ್)

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಉಪಾಹಾರ ಸೇವನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ತಾಸುಗಳ ಒಳಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಉಪಾಹಾರ ಸೇವನುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ಮೂತ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಿರು ಅದರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ಮೌಲಿಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಾಳಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಒರಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಚಾಲೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್)

ವೈಕ್ಯಿಯ ರಕ್ತದ ಸಕ್ತರೆ ಅಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವು ಮಧುಮೇಹ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಲು ಪೂರ್ಕವಾಗಿರದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವುದಿದೆ. ವೈಕ್ಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದು, ರಕ್ತದ ಸಕ್ತರೆಯ ಅಂಶ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುಗ, ಮೂತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ತರೆಯ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ರಕ್ತದ ಸಕ್ತರೆ ಅಂಶ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುಗ, ಕುಟುಂಬದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದಾಗ, ಗಿಫ್ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಭೂಳಿದ ತಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಧುಮೇಹದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನದಿನತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ ಖಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಂತರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞರು 75 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಾರು ಮುಲೀಎರ್ ನೀರನಲ್ಲಿ ಬೆರಿಸಿ, ವೈಕ್ಯಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವೈಕ್ಯಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಈ ವೈಕ್ಯಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕ್ಯಿ ಮಧುಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ. ಏತ್ತಾತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೇವನಿ ಬಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಒಳಕ್ಕ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ತರೆ ಅಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗಿಫ್ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮೌಲಿಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಒರಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಚಾಲೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್)

ಗಿಫ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮಧುಮೇಹ ಬೆಳೆಯತ್ತಿರುವ ಭೂಳಿದ ಮೇಲೆ ವೈಕ್ಯಿಕ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಿರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿರುವ ಇದನ್ನು ಪತ್ತ ಹೆಚ್ಚಲು ಸ್ಥಿರೋಗ ತಜ್ಞರು ಗಿಫ್ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇ-

ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಿಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ನೀರನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಯಾವದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಕ್ತರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

### ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೌಷ್ಟೆಲ್

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕೊಳ್ಳಿನಂಶಗಳಾದ ಕೊಲಸ್ಯಾಲ್, ಎಕ್ಸೋಡಿಲ್, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರ್ಡ್, ಎಲಾಡಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಲೊಡಿಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೌಷ್ಟೆಲ್ ಪರಿಕ್ಷೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗಲೂ ವೈಕ್ಯಿ ಹಕ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಉಂಟವಾದ ಒಳಕ್ಕ ನೀರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಹಿಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತಾಲ್ಲೂ ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಪಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳೂ ಎಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಏಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಠಿಸಿದರೆ ಕೊಳ್ಳಿನಂಶದ ನಿರ್ವಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

### ಘೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

ದಿನದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಘೈರಾಯ್ಡ್ ರಸದೂತಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಶಾರಿರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಸದೂತಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಜಲನಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದೆಯಾಗುವ ಕೊಳ್ಳಿನಂಶವು ರಸದೂತದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಒಮ್ಮೆಮೈ ತಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಹೊದಲು ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಘೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವ ದಿನದಾದು ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮಾತ್ರೆ