



ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.8.8ರಪ್ಪು ನೀರು, ಶೇ.3ರಪ್ಪು ಬೈಂಟೆನು ಮತ್ತು ಕೆವಲ ಶೇ.3ರಪ್ಪು ಕೊಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೀಲುಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೆ ದು ಬಾರಿ ಹಾಲುಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಲ್‌ಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡುಗಳೊಡನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನೆ ನೊಕೊನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಸೀಲ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಹೇರಳವಾಗಿ ನೋಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 9ರಿಂದ 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಲ್‌ಗಳು ಗಭರ್ ಹೊರುತ್ತವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಮರಿಗಳು ಸಂತಾನೋಽಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಇಂತಹ ದುಂಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಮರಿಗಳನ್ನು ಗಭರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತು ದಂಡೆಗೆ ಬರುವ ಸೀಲ್‌ಗಳು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ತೆವಳುತ್ತೆ ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಾರ ಹಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಛಿಳಿಪ್ಪರುಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತ, ಒಂದಿಪ್ಪ ಹೊರಳಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸುತ್ತವೆ.

ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇವುಗಳ ಮೈತುಂಬ ಬಿಳಿಯ ಉದ್ದ ತುಪ್ಪಟಿವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಪ್ಪು ಕೆಣ್ಣಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುವೆಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಛಿಳಿಪ್ಪರುಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತ, ‘ಮಾ...’ ‘ಮಾ’ (ಅಮಾ_ ಅಥವಾ ಮವಾ ಎನ್ನುವರೆಯೇ) ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಹೊರಡಿಸುತ್ತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಚ್ಚೆಯನ್ನಿಡುತ್ತವೆ.

ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಇದೇ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಗೆ ಮರಿಗಳನ್ನಿಡಲು ಮರಳ ಬರಲು ಬೇಕಾದ ನಕ್ಷೆಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿಲ್ಲದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಲ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಳೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ‘ಹು...’